


## Réseau de surveillance volontaire des lacs

### Lac Saint-Joseph (0013A) - Suivi de la qualité de l'eau 2007


Transparence de l'eau - Été 2007  
(profondeur du disque de Secchi en mètres)



Données physicochimiques - Été 2007

Date	Phosphore total (µg/l)	Chlorophylle a (µg/l)	Carbone organique dissous (mg/l)
2007-05-30	6,4	1,8	3
2007-06-27	3,5	2	2,3
2007-07-23	4,5	1,6	2,4
2007-08-28	3,6	2	2,8
2007-09-25	6,3	4	2,8
<b>Moyenne estivale</b>	<b>4,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>

Classement du niveau trophique - Été 2007



## Physicochimie

- Le Lac Saint-Joseph compte 2 stations de surveillance. Cette fiche présente les résultats de la station 0013A. Une excellente estimation de la transparence moyenne estivale de l'eau a été obtenue par 17 mesures de la profondeur du disque de Secchi. Cette transparence de 5,3 m caractérise une eau claire. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la zone de transition oligo-mésotrophe.
- La concentration moyenne de phosphore total trace mesurée est de 4,9 µg/l, ce qui indique que l'eau est peu enrichie par cet élément nutritif. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la classe oligotrophe.
- La concentration moyenne de chlorophylle a est de 2,3 µg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse d'algues microscopiques en suspension est faible. Cette variable situe l'état trophique du lac à cette station dans la classe oligotrophe.
- La concentration moyenne de carbone organique dissous est de 2,7 mg/l, ce qui indique que l'eau est peu colorée. La couleur a donc probablement une très faible incidence sur la transparence de l'eau.

## État trophique et recommandations

- L'ensemble des variables physicochimiques mesurées à la station 0013A situe l'état trophique du lac dans la classe oligotrophe. Le sommaire des résultats des années de suivi pour cette station est illustré dans la fiche pluriannuelle.
- L'intégration des données recueillies à chacune des stations de surveillance permet de situer l'état trophique du Lac Saint-Joseph dans la zone de transition oligo-mésotrophe. Ce lac présente certains signes d'eutrophisation. Afin de ralentir ce processus, le MELCCFP recommande l'adoption de mesures pour limiter les apports de matières nutritives issues des activités humaines. Cela permettrait de préserver l'état du lac et ses usages.

Note : Une évaluation complète de l'état trophique du lac devrait notamment tenir compte de certaines composantes du littoral telles que les plantes aquatiques, le périphyton et les sédiments.

Date de production: 2024-02-09